

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**ЛЮГОЛЯ РАСТВОР С ГЛИЦЕРИНОМ**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:** Р N001888/01 от 18.11. 2009

**ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:**

Люголя раствор с глицерином

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА:**

раствор для местного применения

**СОСТАВ:**

Для приготовления 100 г раствора используют:

Йода	-1 г
Калия йодида	-2 г
Глицерина	-94 г
Воды очищенной	-3 г

**ОПИСАНИЕ:**

Прозрачная сиропообразная жидкость красно-бурого цвета с запахом йода.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:** Антисептическое средство.

**КОД АТХ:** [D08AG]

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:** Препарат йода оказывает антисептическое действие.

**ПОКАЗАНИЯ:**

Воспалительные заболевания слизистых оболочек глотки и гортани.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Повышенная чувствительность к йоду. Тяжелые заболевания печени и почек.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:** Местно, для смазывания или орошения слизистой оболочки глотки, гортани. Распылять раствор одним нажатием головки распылителя. В момент вспрыскивания рекомендуется задержать дыхание. Не допускается попадание препарата в глаза. Если это произошло, глаза следует промыть большим количеством воды.

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:** Аллергические реакции. В случае длительного применения препаратов йода и повышенной чувствительности к ним возможны явления йодизма (ринит, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь).

**ФОРМА ВЫПУСКА:** Раствор для местного применения.

По 25 г, 30 г, 40 г, 50 г во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной или во флаконы из коричневого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми из полимерных материалов.

По 100 г в банки оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией.

По 25 г, 50 г во флаконы-капельницы оранжевого стекла, или во флаконы-капельницы из коричневого стекла, укупоренные полиэтиленовой пробкой-капельницей и крышкой навинчиваемой из полимерных материалов, или укупоренные крышками из полимерных материалов.

По 25 г, 30 г, 40 г, 50 г, 100 г во флаконы-капельницы с винтовой горловиной.

Каждый флакон, банку или флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Каждый флакон, укупоренный пробкой и крышкой в комплекте с дозатором и распылителем или укупоренный крышкой с дозатором в комплекте с распылителем и с наконечником и инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Каждый флакон, банку или флакон-капельницу помещают в групповую упаковку, с вложением соответствующего количества инструкций по медицинскому применению «Для стационаров».

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку картонную.

**СРОК ГОДНОСТИ:**

4 года. Не использовать по истечении срока годности!

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:**

Без рецепта.

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ**

**ПРЕТЕНЗИИ:** ЗАО «ЭКОлаб»: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,

Тел (49643) 3-26-49 – отд. продаж, 3-37-30 – ОБТК, факс 3-34-05.