

ИНСТРУКЦИЯ

По медицинскому применению лекарственного препарата

Пертуссин-ЭКО

Регистрационный номер: ЛП – 001228

Торговое название: Пертуссин-ЭКО.

Лекарственная форма: сироп

Состав (на 100 г):

Действующие вещества:

Чабреца экстракт жидкий - 12,0 г

Калия бромид - 1,0 г

Вспомогательные вещества:

Сахароза - 52,48 г

Этанола (спирта этилового 95 %) - 3,975 г

Воды очищенной -30,545 г

Описание: густая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, с ароматным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: отхаркивающее средство.

Код АТХ: R05CA.

Фармакологические свойства: комбинированный препарат. Экстракт травы чабреца оказывает отхаркивающее действие, увеличивает количество секреторного отделяемого слизистых оболочек верхних дыхательных путей, способствует разжижению мокроты и ускорению ее эвакуации. Бромид калия снижает возбудимость центральной нервной системы.

Фармакокинетика: данные отсутствуют.

Показания к применению: в качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний, трахеитов, бронхитов, а также у детей при коклюше.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия, хроническая сердечная недостаточность (в стадии декомпенсации), беременность, период грудного вскармливания, непереносимость фруктозы, дефицит сахарозы/изомальтозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст (до 3 лет).

С осторожностью: сахарный диабет; детский возраст старше 3 лет (в связи с наличием этанола в препарате).

Способ применения и дозы: препарат принимается внутрь, после еды (в связи с возможностью снижения аппетита).

Взрослым - по 1 столовой ложке 3 раза в день;

детям от 3 до 6 лет – по 1/2 - 1 чайной ложке 3 раза в день;

детям от 6 до 12 лет – по 1-2 чайной ложке 3 раза в день;

детям старше 12 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в день.

Курс лечения 10 – 14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, изжога.

Передозировка: в случае передозировки препарата возможна тошнота.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания: препарат содержит 8-11 % этанола. Содержание абсолютного спирта составляет: в 1 чайной ложке (5 мл) до 0,43 г, в 1 десертной ложке (10 мл) - до 0,87 г, в 1 столовой ложке (15 мл) – до 1,3 г.

В максимальной суточной дозе препарата для взрослых – 3 столовые ложки (45 мл) – содержится до 3,9 г абсолютного этилового спирта.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Указание для больных сахарным диабетом: содержание сахарозы в 1 чайной ложке (5 мл) препарата соответствует примерно 0,32 ХЕ, в 1 десертной ложке (10 мл) – примерно 0,64 ХЕ; в 1 столовой ложке – примерно 0,96 ХЕ.

Форма выпуска: по 100 г, 125 г во флаконы, банки оранжевого стекла с винтовой горловиной или во флаконы коричневого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками и (или) навинчиваемыми крышками из полимерных материалов или средствами укупорочными или колпачками алюминиевыми с перфорацией.

По 100г. 125 г. во флаконы с крышками из полиэтилентерефталата для упаковки лекарственных средств или флаконы, банки из полиэтилентерефталата для лекарственных средств со средствами укупорочными.

Каждый флакон, банку вместе с инструкцией по медицинскому применению, мерной ложкой или мерным стаканчиком помещают в пачку картонную.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку.

Каждый флакон, банку без пачки помещают в ящики или коробки с маркировкой «Для стационаров» с равным количеством инструкций по применению. Количество флаконов, банок в упаковке для стационаров – 12, 15, 18, 36, 40 штук.

Условия хранения: В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 4 года.

Не использовать по истечении срока годности!

Условия отпуска из аптек: отпускают без рецепта.

Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии: ЗАО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1, тел (49643) 3-26-49- отдел продаж, 3-37-30 -ОБТК, факс 3-34-05.