

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

КАЛЕНДУЛА НАСТОЙКА

Регистрационный номер: Р N001887/01 от 26.12.2008

Торговое название: Календулы настойка

Лекарственная форма: Настойка

Состав:

Для приготовления настойки необходимо:

Ноготков цветков – 100г

Этанола 70% (этилового спирта) – достаточное количество до получения 1л настойки

Описание: прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа:

Антисептическое и противовоспалительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие:

Настойка календулы оказывает антисептическое, желчегонное, спазмолитическое и местное противовоспалительное средство.

Показания к применению:

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах; местно – для полоскания горла при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллиты, фарингиты, ларингиты, фаринголарингиты) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит).

Внутри настойку календулы применяют при холецистите, холангите.

Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. При применении внутри-острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

С осторожностью – заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы:

Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек.

Для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта используют ½-1 стакан водного раствора настойки.

Внутри за 15 минут до еды применяют по 10-20 капель, разведённых в ¼ стакана воды 3 раза в день

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (в т.ч. кожный зуд). При приеме внутрь – изжога, тошнота, горечь во рту, усиление болей в животе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время не выявлено

Особые указания:

Содержание абсолютного спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23г, в максимальной суточной дозе-0,7г

В период лечения (при приёме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания, быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска:

Настойка. По 25мл, 40мл, 50мл, 100мл во флаконы оранжевого стекла.

По 100мл в банки оранжевого стекла.

По 25мл, 50мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла. Каждый флакон, банку и флакон-капельницу с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Допускается наносить полный текст инструкции по медицинскому применению на пачку вместо инструкции, вкладываемой в пачку.

Условия хранения: в защищенном от света месте, при температуре не выше 25⁰С

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 4 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта