

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата
Солодки сироп

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: P N002185/01

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Солодки сироп.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ:** Солодки корней экстракт.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: Сироп

СОСТАВ:

Активный компонент:

Солодки корней экстракт (Солодки экстракт густой) – 4,0 г

Вспомогательные вещества:

Сахароз (сахар) – 55,0 г

Этанол 90% (этиловый спирт) – 10,0 г

Вода очищенная – 31,0 г

ОПИСАНИЕ: Жидкость коричневого цвета, своеобразного запаха.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА. Отхаркивающее средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Препарат оказывает отхаркивающее действие, обусловленное, в первую очередь, наличием глицирризина, усиливающего функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Применяют у взрослых и детей в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем, главным образом, при наличии плохо отделяемого, густого и вязкого секрета (особенно у детей и лиц пожилого возраста).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, дефицит сахарозы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, сахарный диабет, детский возраст.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Взрослым и детям старше 12 лет по 5 мл (1 чайной ложке, предварительно разведенных в ½ стакана воды, 3 раза в день.

Детям до 2 лет – по 1-2 капли (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день;

Детям с 2 до 6 лет – по 2-10 капель (предварительно разведенных в 1 чайной ложке воды) 3 раза в день;

Детям с 6 до 12 лет – по 2,5 мл (1/2 чайной ложке) предварительно разведенной в ½ стакана воды 3 раза в день;

Курс лечения 7-10 дней. Целесообразность проведения повторного курса лечения определяется врачом.

При наличии плохо отделяемой мокроты и для облегчения отхаркивания рекомендуется обильное теплое питье.

При дозировании препарата для взрослых и детей от 6 лет рекомендуется использовать мерную ложку или мерный стаканчик, вложенные в упаковку.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу введения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Возможны аллергические реакции; в отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления (диарея). При длительном применении возможны гипокалиемия, повышение артериального давления, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-электролитного обмена.

ПЕРЕДОЗИРОВКА. При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

ЛЕЧЕНИЕ. Симптоматическое.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. Препарат можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний. Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Информация для больных сахарным диабетом: в одной чайной ложке препарата содержится 0,11 хлебных единиц (ХЕ), в 1 капле – 0,01 ХЕ. Максимальная разовая доза препарата для взрослых содержит 0,43 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза 1,3 г абсолютного этилового спирта, в 1 капле (для детей) – 0,0043 г абсолютного этилового спирта.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ. В период лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

ФОРМА ВЫПУСКА. Сироп. По 100 г или 125 г во флаконы или банки оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовым пробками и навинчиваемыми крышками из полимерных материалов, или крышками из полиэтилентерефталата, или колпачками алюминиевым с перфорацией.

По 100 г или 125 г во флаконы из коричневого стекла, укупоренные крышками из полимерных материалов.

По 100 г или 125 г во флаконы с крышками или флаконы, банки со средствами укупорочными из полиэтилентерефталата для лекарственных средств.

Каждый флакон или банку вместе с инструкцией по применению и мерным стаканчиком или мерной ложкой помещают в пачку картонную. Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку. Каждый флакон, банку без пачки помещают в ящики или коробки с маркировкой «Для стационаров» с равным количеством инструкций по применению. Количество флаконов, банок в упаковке для стационаров – 12, 15, 18, 36, 40 штук.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ. 4 года. Не применять по истечении срока годности!

УСЛОВИЯ ОТПУСКА: Отпускают без рецепта.

Предприятие-производитель/организация, принимающая претензии:

ЗАО «ЭКОлаб», 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 1,

тел.: +7 (49643) 3-37-30, 8-800-333-17-45